

МИНЗДРАВ РОССИИ
 ЛП-001570-261217
 СОГЛАСОВАНО

ИНСТРУКЦИЯ
 ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Визин® Классический

_____ наименование лекарственного препарата

капли глазные 0,5 мг/мл

_____ лекарственная форма, дозировка



Лаборатуар Унигер, Франция





_____ наименование производителя, страна

Изменение № 1

Дата внесения Изменения « _____ » 261217 20__ г.

Старая редакция	Новая редакция
<p>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ</p> <p>Для снятия отека и гиперемии конъюнктивы (покраснения глаз), обусловленных воздействием химических и физических факторов (дым, ветер, пыль, хлорированная вода, свет, косметические средства, контактные линзы), а также возникающих при аллергических реакциях, таких как поллиноз.</p>	<p>ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ</p> <p>Для снятия отека и гиперемии конъюнктивы (покраснения глаз), обусловленных воздействием химических и физических факторов, таких как дым, ветер, пыль, хлорированная вода, свет, косметические средства, контактные линзы.</p>
<p>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ</p> <p>Местно. Взрослым и детям старше 2 лет по 1 капле в пораженный глаз 2–3</p>	<p>СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ</p> <p>Местно. <i>Взрослые и дети старше 6 лет:</i></p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>раза в сутки.</p> <p>Применение препарата более 4 дней должно проводиться только под контролем врача.</p> <p>Инструкция по использованию ампул для однократного применения</p> <p>Каждая ампула препарата «Визин® Классический» предназначена только для однократного применения. Препарат следует использовать сразу после вскрытия ампулы. Количество препарата в одной ампуле достаточно для однократного введения в оба глаза.</p>  <p>1. Отломите одну ампулу от стрипа (рис. 1), а оставшиеся ампулы положите обратно в пакет из фольги.</p>	<p>По 1 или 2 капли в пораженный глаз 2–3 раза в сутки.</p> <p><i>Дети от 2 до 6 лет:</i></p> <p>Применение препарата возможно после консультации с медицинским работником.</p> <p>Применение препарата более 4 дней должно проводиться только под контролем врача.</p> <p>Инструкция по использованию ампул для однократного применения</p> <p>Каждая ампула препарата «Визин® Классический» предназначена только для однократного применения. Препарат следует использовать сразу после вскрытия ампулы. Количество препарата в одной ампуле достаточно для однократного введения в оба глаза.</p>  <p>1. Отломите одну ампулу от стрипа (рис. 1), а оставшиеся ампулы положите обратно в</p>

Старая редакция	Новая редакция
 <p data-bbox="544 248 831 757">2. Откройте ампулу, отвернув верхнюю, незаполненную часть ампулы (рис. 2).</p>	<p data-bbox="1241 248 1374 353">пакет из фольги.</p>  <p data-bbox="1187 488 1469 981">2. Откройте ампулу, отвернув верхнюю, незаполненную часть ампулы (рис. 2).</p>
 <p data-bbox="544 763 831 1458">3. Закапайте препарат в конъюнктивный мешок, слегка надавливая на заполненную часть ампулы (рис. 3).</p>	 <p data-bbox="1187 1003 1469 1697">3. Закапайте препарат в конъюнктивный мешок, слегка надавливая на заполненную часть ампулы (рис. 3).</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ</p> <p><u>Постмаркетинговые данные</u></p> <p>Очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000, включая отдельные сообщения), частота неизвестна (частота возникновения не может быть оценена на основании имеющихся данных).</p> <p><i>Нарушения со стороны органов зрения:</i> частота неизвестна: расширение зрачка.</p> <p><i>Общие расстройства и нарушения в месте введения:</i> частота неизвестна: реакции в месте введения (включая ощущение жжения в области глаза, покраснение, раздражение, отек, боль, зуд).</p> <p>Предполагается, что частота, вид и тяжесть побочных реакций у детей аналогичны побочным реакциям, наблюдавшимся у взрослых.</p>	<p>ПОБОЧНОЕ ДЕЙСТВИЕ</p> <p><u>Постмаркетинговые данные</u></p> <p>Очень часто (>1/10), часто (>1/100, <1/10), нечасто (>1/1000, <1/100), редко (>1/10000, <1/1000), очень редко (<1/10000, включая отдельные сообщения), частота неизвестна (частота возникновения не может быть оценена на основании имеющихся данных).</p> <p><i>Нарушения со стороны органов зрения:</i> частота неизвестна: усиление слезотечения, расширение зрачка.</p> <p><i>Общие расстройства и нарушения в месте введения:</i> частота неизвестна: реакции в месте введения (включая ощущение жжения в области глаза, покраснение, раздражение, отек, боль, зуд).</p> <p>Предполагается, что частота, вид и тяжесть побочных реакций у детей аналогичны побочным реакциям, наблюдавшимся у взрослых.</p>
<p>ПЕРЕДОЗИРОВКА</p> <p>При применении в соответствии с инструкцией по применению риск возникновения передозировки минимален. Однако при случайном</p>	<p>ПЕРЕДОЗИРОВКА</p> <p>При применении в соответствии с инструкцией по применению риск возникновения передозировки минимален. Однако при случайном</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>попадании препарата в желудочно-кишечный тракт (проглатывании) возможны следующие симптомы передозировки: расширение зрачка, тошнота, цианоз, лихорадка, судороги, тахикардия, аритмия, остановка сердца, артериальная гипотензия, отек легких, угнетение дыхательной функции, включая апноэ (остановку дыхания), угнетение функции центральной нервной системы, включая развитие сонливости и кому.</p> <p>Риск развития симптомов передозировки, обусловленных системными эффектами препарата, высок у новорожденных и маленьких детей, особенно при проглатывании.</p> <p>Специфический антидот неизвестен.</p> <p>Лечение передозировки при попадании в ЖКТ: назначают активированный уголь, промывание желудка, ингаляцию кислородом, жаропонижающие и противосудорожные средства. Для снижения артериального давления применяют фентоламин по 5 мг на физиологическом растворе медленно</p>	<p>попадании препарата в желудочно-кишечный тракт (проглатывании) возможны следующие симптомы передозировки: расширение зрачка, тошнота, рвота, цианоз, лихорадка, судороги, тахикардия, брадикардия, аритмия, остановка сердца, артериальная гипотензия, отек легких, угнетение дыхательной функции, включая апноэ (остановку дыхания), гипотермия, угнетение функции центральной нервной системы, седативный эффект, вялость, ступор, слюнотечение, развитие сонливости, кома.</p> <p>Риск развития симптомов передозировки, обусловленных системными эффектами препарата, высок у новорожденных и маленьких детей, особенно при проглатывании.</p> <p>Специфический антидот неизвестен.</p> <p>Лечение передозировки при попадании в ЖКТ: назначают активированный уголь, промывание желудка, ингаляцию кислородом, жаропонижающие и противосудорожные средства. Для снижения артериального давления</p>

Старая редакция	Новая редакция
<p>внутривенно или по 100 мг внутрь. Больным с низким артериальным давлением вазопрессорные средства противопоказаны.</p> <p>При появлении любых симптомов передозировки, описанных выше, следует немедленно обратиться к врачу!</p>	<p>применяют фентоламин по 5 мг на физиологическом растворе медленно внутривенно или по 100 мг внутрь. Больным с низким артериальным давлением вазопрессорные средства противопоказаны.</p> <p>Препарат следует хранить в недоступном для детей месте. При случайном проглатывании или появлении любых симптомов передозировки, описанных выше, следует немедленно обратиться к врачу!</p>

Специалист по регистрации
 ООО «Джонсон & Джонсон»



Н.Н. Врублевская